

Información del Producto: Peróxido de Hidrógeno

¿Qué es?

Es un desinfectante a base de peróxido de hidrógeno acelerado (AHP). Limpia y desinfecta en un solo paso. Elimina bacterias, virus, hongos y esporas en poco tiempo, sin dañar las superficies ni dejar residuos tóxicos.

¿Dónde se usa en el hospital?

- Sectores con pacientes aislados:
- En sectores con pacientes con **Sospecha o Presencia CLOSTRIDIUM DIFFICILE**.
- En la limpieza y desinfección de superficies de las áreas críticas (excepto pisos y equipos Biomédicos), una vez por semana, en reemplazo del amonio cuaternario.



¿Para qué se usa en el hospital?

Se emplea como reemplazo de productos a base de amonios cuaternarios principalmente para:

- **Superficies de alto contacto** en habitaciones o áreas críticas (barandas, camas, colchones, mesas, monitores, bombas de infusión, sanitarios, etc.).
- Desinfección terminal o profunda de áreas donde hubo pacientes con bacterias multirresistentes. Producto con mayor potencia que el amonio cuaternario.
- Equipamiento médico (tensiómetros, oxímetros, etc.) y superficies plásticas o metálicas delicadas de áreas críticas.

¿Cómo se usa?

Aplicación:

1. Humedecer el paño DESCARTABLE con el producto y repasar las superficies de alto contacto: unidad del paciente y áreas críticas.
2. Garantizar que la superficie permanezca húmeda durante 5 minutos (tiempo de contacto). No requiere enjuague, salvo que la superficie esté en contacto directo con alimentos.

Tiempo de contacto: 5 minutos para eliminar esporas bacterianas, bacterias, virus y hongos.



¿Cómo se prepara?

Producto Marca utilizada: OXIVIR FIVE 16 concentrado

Preparación: Debe diluirse 1:16 (60 ml de producto por litro de agua). Garantizar que el envase se encuentre limpio y seco.



Dosificador de mano: cargar el dosificador con producto concentrado. Cerra la tapa de carga y presionar el cuerpo del envase hasta cargar el receptáculo con la medida deseada (dosis definida en el envase en función de los litros a preparar), dejar de presionar y verter la dosis medida en el recipiente de la solución final (balde o rociador).

¿Cuándo se descarta?

Una vez diluido en el envase se encuentra activo hasta 24 horas. Luego descartar en drenaje.

¿Cuáles son las precauciones?

- Utilizar protector ocular y guantes en el momento de la dosificación o manipulación del bidón de producto sin diluir.
- Evitar contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua. No ingerir. Frente alguna exposición recurrir a ficha de seguridad del producto.
- No pulverizar o aplicar sobre las personas.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ⚠

El personal de limpieza debe utilizar EPP (como guantes y protectores oculares o máscara facial) durante la preparación para evitar posibles accidentes laborales, como el salpicado en los ojos.

